



## Gabarito

Questão 1. .... / 4 pts

Considere as funções  $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$  e  $g(x) = 4x - 4$ .

- (a) [2 pts] Esboce a região limitada pelo gráfico dessas funções.  
(b) [2 pts] Determine a área dessa região.

### Solução:

- (a) Vamos esboçar os dois gráficos juntos e a região entre eles. Como ambos são polinômios, vamos primeiro determinar suas raízes. É fácil ver que  $x = 1$  é raiz de  $f$ , portanto, fazendo a divisão polinomial de  $x^3 - 2x^2 - x + 2$  por  $x - 1$ , temos que

$$f(x) = (x - 1)(x^2 - x - 2).$$

Com isso,

$$f(x) = 0 \Rightarrow (x - 1)(x^2 - x - 2) = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ ou } x = -1 \text{ ou } x = 2.$$

Obviamente

$$g(x) = 0 \Rightarrow 4x - 4 = 0 \Rightarrow x = 1.$$


Agora vejamos os pontos de interseção. Claro que um dos pontos de interseção é  $x = 1$ . Os demais, podemos obter fazendo:

$$\begin{aligned} f(x) = g(x) &\Rightarrow (x - 1)(x^2 - x - 2) = 4(x - 1) \\ &\Rightarrow x^2 - x - 2 = 4 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \\ &\Rightarrow x = -2 \text{ ou } x = 3. \end{aligned}$$

Em resumo, os pontos de interseção são

$$x = 1 \text{ ou } x = -2 \text{ ou } x = 3.$$

Portanto, podemos facilmente esboçar os gráficos e a região de interseção.





(b) Vamos calcular a integral indefinida de  $f(x) - g(x)$ .

$$\int x^3 - 2x^2 - 5x + 6 dx = \frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 6x + C.$$

Com isso,

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^1 f(x) - g(x) dx + \int_1^3 g(x) - f(x) dx \\ &= \int_{-2}^1 x^3 - 2x^2 - 5x + 6 dx + \int_1^3 -x^3 + 2x^2 + 5x - 6 dx = \frac{63}{4} + \frac{16}{3} = \frac{253}{12} \end{aligned}$$



Questão 2. .... / 6 pts

Determine uma EDO que tenha como solução geral:

- (a) [2 pts]  $y(x) = Ae^{-x} + Be^{\frac{x}{2}}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .  
(b) [2 pts]  $y(x) = (A + Bx)e^{-\frac{x}{3}}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .  
(c) [2 pts]  $y(x) = (A \cos(3x) + B \sin(3x))e^{2x}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

**Solução:**

- (a) As raízes da equação característica são  $\lambda_1 = -1$  e  $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ . Portanto, a equação característica é:

$$\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)(\lambda + 1) = \lambda^2 + \frac{\lambda}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

Portanto uma EDO é:

$$y'' + \frac{y'}{2} - \frac{y}{2} = 0.$$

- (b) Como a única raiz é  $\lambda = -\frac{1}{3}$ , temos que a equação característica é característico é

$$\left(\lambda + \frac{1}{3}\right)^2 = \lambda^2 + \frac{2\lambda}{3} + \frac{1}{9} = 0.$$

Portanto, a EDO buscada é

$$y'' + \frac{2y'}{3} + \frac{y}{9} = 0.$$

- (c) Sabemos que as raízes da equação características são:

$$\lambda_1 = 2 + 3i, \quad \lambda_2 = 2 - 3i.$$

Com isso, a equação característica é:

$$(\lambda - 2 - 3i)(\lambda - 2 + 3i) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 4\lambda + 13 = 0$$

Portanto,

$$y'' - 4y' + 13y = 0.$$