



## Gabarito

Questão 1. .... / 4 pts

Considere os vetores

$$\vec{u} = (2, x - 1, -1), \text{ e } \vec{v} = (3, 2, 0).$$

- (a) [1 pt] Determine o valor de  $x$  para que os vetores sejam ortogonais.
- (b) [1 pt] Determine  $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v}$ .
- (c) [1 pt] Determine a área do paralelograma que tem como arestas os representantes dos vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  com mesma origem.
- (d) [1 pt] Determine uma equação para o plano que passa pela origem e é gerado por  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ .

### Solução:

- (a) Note que

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow (2, x - 1, -1) \cdot (3, 2, 0) = 2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2.$$

- (b)

$$\vec{u} \times \vec{v} = (2, -3, 13).$$

- (c) Sabemos que a área deste paralelograma é dada pela norma de  $\vec{w}$ , portanto

$$\text{Área} = \|\vec{w}\| = \sqrt{4 + 9 + 169} = \sqrt{182}.$$

- (d) Como  $\vec{w}$  é ortogonal aos vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  simultaneamente, sabemos que a equação do plano é dada por:

$$2x - 3y + 13z = 0.$$



Questão 2. .... / 3 pts

Determine conjunto solução do seguinte sistema linear

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 + x_5 = -1 \\ -x_1 + x_3 - x_4 - 2x_5 = 1 \\ 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 2x_5 = 1 \\ -2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 - 4x_5 = 4 \end{cases}$$

**Solução:** Escrevendo o sistema na forma matricial, temos:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 & -2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 & -1 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

Vamos obter a forma escalonada reduzida de A

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 & -2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 & -1 & -4 & 4 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_2 \rightarrow L_2 - L_1 \\ L_4 \rightarrow L_4 - 2L_1 \end{array} \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 3 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 3 & -6 & 6 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_1 \rightarrow -L_1 \\ L_2 \rightarrow -L_2 \\ L_3 \rightarrow L_3 + 3L_2 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 7 & 5 & -7 & 7 \\ 0 & 0 & 6 & 3 & -6 & 6 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_4 \rightarrow \frac{1}{3}L_4 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 7 & 5 & -7 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_4 \rightarrow 7L_4 - 2L_3 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 7 & 5 & -7 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_4 \rightarrow -\frac{1}{3}L_4 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 7 & 5 & -7 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_1 \rightarrow L_1 - 2L_4 \\ L_2 \rightarrow L_2 + L_4 \\ L_3 \rightarrow L_3 - 5L_4 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 7 & 0 & -7 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_3 \rightarrow \frac{1}{7}L_3 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_1 \rightarrow L_1 - 2L_3 \\ L_2 \rightarrow L_2 + 3L_3 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} L_1 \rightarrow L_1 + L_2 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Como isso, o sistema inicial é equivalente ao sistema:

$$\begin{cases} x_1 + x_5 = 0 \\ x_2 = 1 \\ x_3 - x_5 = 1 \\ x_4 = 0, \end{cases}$$

O que nos fornece o conjunto solução:

$$S = \{(-x_5, 1, x_5 + 1, 0, x_5); x_5 \in \mathbb{R}\}$$





Questão 3. .... / 3 pts

Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

- (a) [2 pts] Determine os autovalores de  $A$ .
- (b) [1 pt]  $A$  é diagonalizável? Justifique. Se sim, determine a matriz e a matriz diagonal  $D$  semelhante a  $A$ .

**Solução:**

(a) Vamos calcular o polinômio característico.

$$p(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -\lambda - 3 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 - \lambda \end{bmatrix} = \lambda(\lambda - 4)(\lambda - 1)(\lambda + 3).$$

Com isso, os autovalores são:

$$\lambda = -3, \lambda = 0, \lambda = 1 \text{ e } \lambda = 4.$$

(b) Como a matriz possui 4 autovalores distintos, ela é diagonalizável. Neste caso, a matriz diagonal é:

$$D = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$